

Corrigé du cas clinique

#14

QUESTION N°1 - Réponses attendues :	cotation
En externe (= en consultation)	2
Pose d'un spéculum	2
Prélèvement exocol	2
Prélèvement endocol	2
Milieu liquide ou étalement sur lame	2
Analyse cytologique	2
Sous-total	12

QUESTION N°2 - Réponses attendues :	cotation
Frottis cervico-vaginaux	2
6 mois après	2
Colposcopie	2
avec biopsies	2
Recherche HPV oncogène	2
Sur prélèvement vaginal (ou sur milieu liquide du frottis)	2
Conisation = zéro à la question	
Sous-total	12

QUESTION N°3 - Réponses attendues :	cotation
Conisation	4
Examen anatomo-pathologique	4
Surveillance (2 points) par frottis + test HPV ou colposcopie (2 points)	4
Sous-total	12

QUESTION N°4 - Réponse attendue :	cotation
Arrêt du tabac	4
Consultation anti-tabac/addictologie/psychologue	4
Substituts nicotiques (patchs, gommages, pastilles)	4
Sous-total	12



Corrigé du cas clinique

#14

QUESTION N°5 - Réponses attendues :	cotation
Sérologie HIV1 et HIV2	4
Sérologie hépatite B et syphilis	4
Infection HIV cofacteur des dysplasies cervicales et du cancer du col de l'utérus	4
Sous-total	12

QUESTION N°6 - Réponses attendues :	cotation
Vaccination de rattrapage possible (2 points) car pas de rapport sexuel (2 points)	4
L'antécédent familial de sclérose en plaque n'est pas une contre-indication	4
Diminution de la prévalence des infections à <i>Human papillomavirus humain</i>	4
Sous-total	12

QUESTION N°7 - Réponses attendues :	cotation
Frottis cervico-utérin (FCU)	4
tous les 3 ans	4
à partir de 25 ans	4
jusqu'à 65 ans	4
Sous-total	16

QUESTION N°8 - Réponses attendues :	cotation
Complication du site d'injection (ecchymose, gonflement, douleur, érythème)	4
Signes généraux : fièvre (2 points), nausées/céphalées (2 points)	4
Déclaration de pharmacovigilance	4
Sous-total	12

NOTE MAXIMALE AU DOSSIER	100
---------------------------------	------------

